

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ГЛИЦЕРИН

Регистрационный номер:

Торговое наименование: ГЛИЦЕРИН

Международное непатентованное или группировочное наименование: глицерол

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав:

Состав на 1 суппозиторий:

<i>Действующее вещество:</i>	1,24 г	2,11 г
Глицерол (в пересчете на 100 % вещество)	1,24 г	2,11 г
<i>Вспомогательные вещества:</i>		
Макрогол 400 (Полиэтиленоксид 400)	0,12 г	0,21 г
Стеариновая кислота	0,12 г	0,205 г
Натрия карбонат декагидрат	0,06 г	0,103 г

Описание

Суппозитории прозрачные или полупрозрачные, почти бесцветные или с желтовато-коричневатым оттенком цвета, с мажущейся поверхностью, торпедообразной формы. Допускается равномерное помутнение суппозитория, незначительное размягчение поверхностного слоя и подпотевание контурной упаковки. На срезе допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

Фармакотерапевтическая группа: слабительное средство.

Код АТХ: А06АХ01

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика

Слабительное средство.

При использовании в виде ректальных суппозитория смягчает и смазывает затвердевшие фекальные массы, облегчает их прохождение по толстой кишке, оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку кишечника, рефлекторно стимулируя моторику кишечника, инициирует процесс дефекации, облегчает прохождение и выведение каловых масс.

Фармакокинетика

Метаболизируется в печени.

Выводится через почки, в неизменном виде выделяется 7-14%.

Показания к применению

Симптоматическое лечение запоров различной этиологии, когда применение пероральных слабительных препаратов невозможно.

Профилактика запоров у пациентов, которые не могут напрягаться при дефекации: болезненный тромбированный геморрой, трещины заднего прохода или перианальный абсцесс, аноректальный стеноз, после перенесенного инфаркта миокарда, после родов; перед и после хирургических операций на прямой кишке, перед инструментальным и рентгенологическим исследованием прямой кишки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к глицеролу или любому из компонентов препарата. Синдром раздраженного кишечника, кишечная непроходимость, аппендицит, кровотечение, диарея, геморрой в стадии обострения, трещины заднего прохода, воспалительные заболевания и опухоли прямой кишки, недиагностированная боль в животе, геморрагический ректоколит, беременность, детям до 5 лет.

С осторожностью

Почечная недостаточность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременность

При беременности применение препарата противопоказано из-за возможной рефлекторной стимуляции матки.

Период грудного вскармливания

Неизвестно, проникает ли глицерол в грудное молоко, поэтому в период грудного вскармливания применение препарата возможно только в том случае, если, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Способ применения и дозы

Ректально.

Вводят препарат в прямую кишку и оставляют там не менее 5 минут. Обычно дефекация происходит через 5-10 минут после введения препарата. Остатки суппозитория выводятся из кишечника с калом.

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 суппозиторию, содержащему 2,11 г глицерола, 1 раз в сутки. При необходимости дозу повышают до 2 суппозитория в сутки.

Детям с 5 лет до 12 лет назначают по 1 суппозиторию, содержащему 1.24 г глицерола, 1 раз в сутки.

Перед и после применения суппозитория необходимо тщательно вымыть руки

Не следует применять препарат более 7 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, *необходимо проконсультироваться с врачом*. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, местные реакции (зуд и жжение кожи), появление спастических болей в области кишечника. При длительном применении возможны явления раздражения прямой кишки, ослабление физиологического процесса дефекации.

При развитии побочных эффектов необходимо обратиться к врачу!

Передозировка

Симптомы: частый жидкий стул.

Лечение: отмена препарата, симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Нет данных.

Особые указания

Систематический прием не рекомендуется. Лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника.

Не смазывать суппозитории минеральными жидкими или твердыми маслами.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и другими механизмами

Не установлено.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 1,24 и 2,11 г.

По 5 штук суппозитория в контурную ячейковую упаковку из пленки ПВХ/ПЭ белой комбинированной или из пленки поливинилхлоридной марки ЭП-73.

На контурную ячейковую упаковку допускается наклеивать этикетку из бумаги писчей, или этикеточной, или самоклеящуюся этикетку.

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона. Пачки помещают в групповую упаковку.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель:

АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»

Россия, 665462, Иркутская область, г. Усолъе-Сибирское, северо-западная часть города, с северо-восточной стороны, в 115 м от Прибайкальской автодороги.

тел./факс:+7 (39543) 58910, +7(39543) 58908

Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии:

АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»

Россия, 665462, Иркутская область, г. Усолъе-Сибирское, северо-западная часть города, с северо-восточной стороны, в 115 м от Прибайкальской автодороги.

тел./факс:+7 (39543) 58910, +7(39543) 58908

Генеральный директор

АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»

Тюстин С.В.