

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
БЕНЗИЛБЕНЗОАТ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: БЕНЗИЛБЕНЗОАТ

Международное непатентованное или группировочное наименование: бензилбензоат.

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав

В 100 г мази содержится:

Действующее вещество

Бензилбензоат (Бензилбензоат медицинский)	20,0 г
---	--------

Вспомогательные вещества

Натрия гидроксид	0,2 г
------------------	-------

Метилпарагидроксибензоат (Нипагин)	0,08 г
------------------------------------	--------

Пропилпарагидроксибензоат (Нипазол)	0,02 г
-------------------------------------	--------

Карбомер (ареспол, полиакрилат редкосшитый)	2,0 г
---	-------

Полисорбат – 80 (твин-80)	1,0 г
---------------------------	-------

Вода очищенная	76,7 г
----------------	--------

Описание

Однородная мазь белого или белого с желтоватым оттенком цвета со специфическим запахом. Допускается наличие пузырьков воздуха.

Фармакотерапевтическая группа

Противочесоточное средство.

Код АТХ: [P03AX01]

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Противопаразитарный препарат для наружного применения. Оказывает токсическое действие в отношении чесоточного клеща. Проходит сквозь хитиновый покров и накапливается в организме клеща в токсических концентрациях (гибель клещей наступает через 7-32 мин). Вызывает гибель личинок и взрослых особей чесоточных клещей; не действует на яйца.

Фармакокинетика

Проникает в верхние слои эпидермиса, не всасывается в системный кровоток.

Показания к применению

Мазь применяется для лечения чесотки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к бензилбензоату и другим компонентам препарата, при беременности и в период грудного вскармливания. Детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период лактации противопоказано.

Способ применения и дозы

Наружно.

Мазь наносят после мытья на ночь на весь кожный покров, исключая лицо и волосистую часть головы, втирая руками, которые не моют до утра, на одно втирание расходуется 30 – 40 г мази. На четвертый день обработку повторяют, на пятый день назначают мытье со сменой нательного и постельного белья. Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие

Жжение, гиперемия кожи, аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

Поскольку при местном применении бензилбензоат практически не всасывается в системный кровоток, случаев передозировки препарата не выявлено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Фармакологического взаимодействия с другими препаратами не выявлено, однако, как и все противопаразитарные средства бензилбензоат не рекомендуется применять одновременно с другими наружными средствами.

Особые указания

Перед началом лечения больному целесообразно принять горячий душ для механического удаления с поверхности кожи клещей, а также разрыхления поверхностного слоя эпидермиса (для облегчения проникновения препарата). После каждого вынужденного мытья рук необходимо вновь обработать. Лечение больных, выявленных в одном очаге, а

также контактных лиц, должно проводиться одновременно во избежание повторного заражения. Сохранение зуда после лечения не является показанием для назначения дополнительного курса специфической терапии. Зуд является реакцией организма на убитого клеща и продукты жизнедеятельности и исчезает при назначении антигистаминных препаратов и мазей с глюкокортикостероидами. После лечения необходим врачебный контроль в течение 2 недель, а при наличии осложнений и более длительное время.

Все предметы, которые соприкасались с зараженной кожей, должны быть подвергнуты тщательной обработке. Постельные принадлежности, белье, полотенца кипятят в растворе стирального порошка в течение 5 - 10 мин. Верхнюю одежду проглаживают с обеих сторон горячим утюгом. Вещи, не подлежащие термической обработке, вывешивают на открытый воздух на 3 дня. Обувь, игрушки и прочие предметы исключают из пользования на 5 дней и помещают в целлофановый пакет. Матрацы, подушки, одеяла также исключаются из использования на 5 дней или подвергаются камерной дезинфекции. Мягкую мебель можно обработать препаратами для дезинсекции. В квартире необходимо провести уборку, мытье полов с моющими средствами или добавлением дезинфицирующих средств. Следует избегать попадания мази в глаза. Нос, полости рта.

При попадании препарата:

- полость рта: полость рта прополоскать обильно водой или 2 % теплым раствором гидрокарбоната натрия («питьевая сода»);
- в желудок: желудок промывают 1 – 2 % раствором гидрокарбоната натрия, водной смесью жженой магнезии и активированного угля (по 1 – 2 столовой ложке на стакан воды);
- в нос: обильно промыть водой;
- в глаза: тщательно промыть водой или раствором гидрокарбоната натрия.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Препарат не оказывает отрицательного влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 20 %

По 15 г, 20 г, 25 г или 30 г в банки темного стекла типа БТС закупоренные крышками полиэтиленовыми натягиваемыми с уплотняющим элементом. На банки наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей или самоклеящиеся.

По 25 г, 30 г, 40 г, 50 г, 70 г, 80 г и 100 г в тубы алюминиевые укупоренные бушоном полимерным. Каждую банку или алюминиевую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

От 9 до 300 штук туб или банок без пачки с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в коробку из картона (Для стационаров).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии:

АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»

Россия, 665462, Иркутская область, г. Усолъе-Сибирское, северо-западная часть города, с северо-восточной стороны, в 115 м от Прибайкальской автодороги.

Тел: +7 (39543) 58910, факс: +7(39543) 58908

Генеральный директор

АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»

Тюстин С.В.