

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЗУБНЫЕ КАПЛИ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: ЗУБНЫЕ КАПЛИ

Международное непатентованное или группировочное наименование: Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + Камфора + Мята перечной листьев масло эфирное

Лекарственная форма: капли зубные

Состав:

в 100 мл содержится:

Действующие вещества:

Мята перечной листьев масло эфирное	3,1 г
Камфора	6,4 мг
Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка	До 100 мл

Описание: Прозрачная жидкость красновато-коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: Местнораздражающее средство.

Код АТХ: А01АD11.

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат. Оказывает местнораздражающее (отвлекающее), умеренное обезболивающее, антисептическое, противовоспалительное и успокаивающее действие.

Показания к применению

Зубная боль (до оказания стоматологической врачебной помощи). В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 12 лет. Беременность, период грудного вскармливания.

С осторожностью

Детский возраст старше 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение лекарственного препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Местно. Ватный тампон, смоченный 2-3 каплями препарата, прикладывают к больному зубу на 5-10 минут.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При попадании на слизистую оболочку рта лекарственный препарат может вызвать ощущение жжения. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При правильном применении лекарственного препарата (местно) передозировка маловероятна; при случайном приеме лекарственного препарата внутрь возможно появление симптомов раздражения желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота) и сонливости. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения лекарственным препаратом необходимо соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Капли зубные.

По 10, 15, 25, 50 мл во флаконы или во флаконы-капельницы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками, с винтовыми крышками.

По 10, 15, 25, 50 мл во флаконы полимерные из полиэтилена высокой плотности, укупоренные крышкой из полиэтилена низкой плотности с уплотнительным элементом или пробкой из полиэтилена низкой плотности и винтовыми крышками из полиэтилена низкой плотности или пробкой-капельницей из полиэтилена низкой плотности и винтовой крышкой из полиэтилена низкой плотности, или во флаконы полимерные из полиэтилена высокой или низкой плотности или из полиэтилентерефталата укупоренные крышкой из полиэтилена низкой плотности с уплотнительным элементом или пробкой из полиэтилена низкой плотности и винтовыми крышками из полиэтилена низкой плотности или пробкой-капельницей из полиэтилена низкой плотности и винтовой крышкой из полиэтилена низкой

плотности, или во флаконы полимерные из полиэтилентерефталата, закупоренные крышкой из полиэтилена низкой плотности с уплотнительным элементом или пробкой из полиэтилена низкой плотности и винтовыми крышками из полиэтилена низкой плотности или пробкой-капельницей из полиэтилена низкой плотности и винтовой крышкой из полиэтилена низкой плотности.

На флакон наклеивают этикетку из бумаги самоклеящейся.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии:

АО «Усолъе-Сибирский Химфармзавод»

Россия, 665462, Иркутская область, г.Усолъе-Сибирское, северо-западная часть города, с северо-восточной стороны, в 115 м от Прибайкальской автодороги.

тел./факс: (39543) 5-89-10, 5-89-08

Генеральный директор
АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»

Тюстин С.В.