

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

**Фукорцин**

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Фукорцин

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Борная кислота+Резорцин+Фенол+Фуксин

**Лекарственная форма:** раствор для наружного применения

**Состав на 100 мл:**

*Действующие вещества:*

Фуксин	- 0,4 г
Борная кислота	- 0,8 г
Фенол	- 3,9 г
Резорцин	- 7,8 г

*Вспомогательные вещества:*

Ацетон	- 4,9 мл
Этанол (этиловый спирт) 95%	- 9,6 мл
Вода очищенная	до 100 мл

**Описание**

Жидкость темно-красного цвета с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое средство.

**Код АТХ:** D08AD.

**Фармакологические свойства**

Обладает антисептическим и противогрибковым действием.

**Показания к применению**

Гнойничковые и грибковые заболевания кожи, поверхностные раны, эрозии, трещины, ссадины кожи.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания.

## **Способ применения и дозы**

Наружно. Раствор наносят с помощью ватного тампона на пораженные участки кожи 2-4 раза в день. После подсыхания жидкости на обработанный участок можно наносить мази и пасты.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

## **Побочное действие**

Кратковременное ощущение жжения и боли, которое проходит самостоятельно и не требует отмены препарата. Аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

## **Передозировка**

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При случайном проглатывании, возможно токсическое отравление в виде головокружения, слабости, расстройства дыхания. Лечение: симптоматическая терапия.

## **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Не изучалось.

## **Особые указания.**

Препарат не следует наносить на обширные участки кожи, слизистые оболочки. При случайном попадании в глаза немедленно промыть обильно водой. Следует учитывать, что препарат имеет красный цвет и может окрашивать белье.

## **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

## **Форма выпуска**

Раствор для наружного применения.

По 10 мл, 15 мл, 25 мл, 50 мл или 100 мл во флаконы из полиэтилена ПНД (полиэтилен низкого давления) или полиэтилентерфталата, укупоренные полимерными крышками. По 10 мл, 15 мл, 25 мл, 50 мл или 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми крышками из ПВД (полиэтилен высокого давления). Допускается комплектация флаконов из полиэтилена ПНД (полиэтилен

низкого давления), полиэтилентерефталата или флаконов оранжевого стекла по 10 мл, 15 мл, 25 мл с крышкой-лопаткой из полипропилена.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

50, 60, 80, 100, 140, 150, 200 флаконов по 10 мл, 15 мл, 25 мл; 50, 80, 100, 120, 140 флаконов по 50 мл и 100 мл вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона («Для стационаров»).

#### **Условия хранения**

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

3 года. Не применять по истечении срока годности.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Производитель/организация, принимающая претензии**

АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»

Россия, 665462, Иркутская область, г. Усолъе-Сибирское, северо-западная часть города, с северо-восточной стороны, в 115 м от Прибайкальской автодороги.

тел./факс: +7 (39543) 58910, +7 (39543) 58908

Генеральный директор

АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»

С.В. Тюстин