

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

КАРДИДРОЛ®

КАП

Регистрационный номер:

Торговое наименование: КАРДИДРОЛ®

КАП

Международное непатентованное или группировочное наименование Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + Ландыша травы настойка + Левоментола раствор в ментилизовалерате + Нитроглицерин

Лекарственная форма: капли подъязычные

Состав на 100 мл:

Действующие вещества:

| | |
|---|----------|
| Нитроглицерин раствор спиртовой 1 % | 2,17 мл |
| эквивалентно 17,8 мг нитроглицерина | |
| Левоментола раствор в ментилизовалерате (валидол) | 4,35 мл |
| Ландыша настойка | 21,70 мл |
| Валерианы настойка | 21,70 мл |

Вспомогательное вещество:

| | |
|------------------------------|--------------|
| Этанол (этиловый спирт) 95 % | До 100,00 мл |
|------------------------------|--------------|

Описание: прозрачная жидкость от светлого коричневатого-желтого до темного желто-зеленого цвета с запахом валерианы и ментола. Возможно появление светлого осадка.

Фармакотерапевтическая группа: Антиангинальное средство.

Код АТХ: [C01DA52].

Фармакологические свойства:

Седативное и спазмолитическое сосудорасширяющее, улучшающее кровоснабжение и метаболизм миокарда. Состав по действию аналогичен прописи, известной как капли Вотчала.

Показания к применению:

Купирование приступов стенокардии, кардиалгия.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к нитратам, шок, коллапс, одновременный прием ингибиторов фосфодиэстеразы-5 (силденафил, варденафил или тадалафил), возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

С осторожностью:

Внутричерепная гипертензия, состояния, сопровождающиеся снижением давления заполнения левого желудочка, в т.ч. тампонада сердца, изолированный митральный стеноз, констриктивный перикардит, неконтролируемая гиповолемия, сердечная недостаточность при нормальном или низком давлении в легочной артерии, геморрагический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, черепно-мозговая травма (недавно перенесенная), токсический отек легких, идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз, закрытоугольная форма глаукомы с высоким внутриглазным давлением; тяжелая анемия, гипертиреоз, нарушение мозгового кровообращения, шок, артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление меньше 90 мм рт. ст.), алкоголизм.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Применять препарат при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы:

Под язык. 10-15 капель принимают с небольшим количеством жидкости или наносят на кусок сахара и держат во рту (под языком), не проглатывая до полного всасывания. С учётом индивидуальной чувствительности и переносимости разовая доза может составлять от 5 до 25 капель. Увеличение разовой дозы с 15 до 25 капель возможно по рекомендации врача. Частота и длительность применения капель зависят от частоты, интенсивности приступов стенокардии, эффективности и переносимости.

Побочное действие:

Со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатическая гипотензия, "нитратная" головная боль, тахикардия, гиперемия, ощущение жара. Со стороны желудочно-кишечного тракта: сухость слизистой оболочки полости рта, тошнота. Неблагоприятные побочные реакции со стороны нервной системы: головокружение. При наличии побочных эффектов рекомендуется уменьшить дозу препарата для однократного приема.

Передозировка:

Симптомы: выраженное снижение артериального давления с ортостатической дисрегуляцией, рефлекторная тахикардия, головная боль; может развиваться астения; головокружение, повышенная сонливость, чувство жара, тошнота, рвота. При подозрении на передозировку необходимо немедленно обратиться за врачебной помощью. До прихода врача пострадавшего следует уложить, приподняв ноги.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

Одновременное применение с вазодилататорами, гипотензивными средствами (ингибиторами ангиотензин- превращающего фермента, бета-адреноблокаторами, блокаторами "медленных" кальциевых каналов), прокаиномидом, трициклическими антидепрессантами, ингибиторами моноаминооксидазы (МАО), ингибиторами фосфодиэстеразы-5 (силденафил, варденафил или тадалафил), а также этанолом, усиливает гипотензивный эффект. Одновременное применение с сапроптерином повышает риск развития артериальной гипотензии.

Особые указания:

На фоне применения препарата КАРДИДРОЛ® КАП возможно значительное снижение артериального давления и появление головокружения при резком переходе в положение «стоя» из положения "лежа" или "сидя"; при употреблении алкоголя, при выполнении физических упражнений и при жаркой погоде. К препарату КАРДИДРОЛ® КАП, как и ко всем органическим нитратам, при частом применении развивается привыкание, при этом требуется повышение дозы. В составе препарата содержится не менее 75% этилового спирта. В максимальной суточной дозе препарата содержится 1,96 г этанола.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска:

Капли подъязычные.

По 25 мл, 50 мл во флаконы-капельницы темного стекла или флаконы ОС-1, укупоренные пробками-капельницами из полиэтилена высокого давления, с крышками навинчиваемыми из полиэтилена низкого давления или из полиэтилена высокого давления.

На флакон-капельницу или флакон наклеивают этикетку самоклеящуюся.

Каждый флакон-капельницу или флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения:

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии:

АО «Усолъе-Сибирский Химфармзавод»

Россия, 665462, Иркутская область, г.Усолъе-Сибирское, северо-западная часть города, с северо-восточной стороны, в 115 м от Прибайкальской автодороги.

тел./факс: (39543) 5-89-10, 5-89-08

Генеральный директор
АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»

Тюстин С.В.