

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Викаир

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Викаир

Международное непатентованное или группировочное наименование: Аира обыкновенного корневища + Висмута субнитрат + Крушины ольховидной кора + Магния карбонат + Натрия гидрокарбонат

Лекарственная форма: таблетки.

Состав

Одна таблетка содержит:

действующие вещества:

висмута нитрат основной - 0,35 г, магния карбонат основной - 0,4 г, натрия гидрокарбонат - 0,2 г, кора крушины порошок - 0,025 г, корневища аира порошок - 0,025 г

вспомогательные вещества: крахмал картофельный, стеариновая кислота или кальция стеарат, тальк.

Описание: таблетки плоскоцилиндрической формы с риской и фаской, розового или розовато-лилового цвета с белыми и темными вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое кишечное и вяжущее средство.

Код АТХ: А02ВХ

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат, оказывает вяжущее, антацидное, слабительное и спазмолитическое действие.

Магния карбонат снижает кислотность желудочного сока, уменьшает активность пепсина.

Висмута субнитрат образует защитную пленку на слизистой оболочке желудка, оказывая противовоспалительное, бактерицидное, репаративное действие.

Входящие в состав аир, обладающий спазмолитическим действием, и крушина, обладающая слабительным действием, способствуют улучшению пассажа по кишечнику.

Показания к применению

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит с повышенной секрецией (со склонностью к запору).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, хронический гастрит с секреторной недостаточностью, хроническая почечная недостаточность, энтероколит, детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены), беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Внутрь, через 1-1,5 часа после еды с 1/4 стакана теплой воды (таблетку следует измельчить или растворить в указанном количестве воды), по 1-2 таблетки 3 раза в день.
Средняя продолжительность лечения 1-2 месяца (при необходимости курс повторяют).
Повторный курс после консультации с врачом.

Побочное действие

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции (кожный зуд, кожная сыпь, крапивница).

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: послабление стула.

Передозировка

Данные о передозировке препаратом отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

На фоне приема м-холиноблокаторов или блокаторов H₂-гистаминовых рецепторов уменьшается потребность в применении препарата. Снижает всасывание тетрациклинов. В сочетании с другими лекарственными средствами, содержащими висмут, повышается концентрация висмута в крови.

Особые указания

Нецелесообразно назначать пациентам с язвенной болезнью в сочетании с хроническим аппендицитом, энтероколитом, холециститом и пациентам с склонностью к кровотечениям. Необходимо учитывать развитие энцефалопатии, связанной с накоплением висмута в центральной нервной системе. В период лечения кал окрашивается в черный цвет.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной, или по 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку из бумаги с полиэтиленовым покрытием или полимерным покрытием.

По 10, 20 или 30 таблеток в банки полимерные в комплекте с крышками или в банки из полистирола.

Каждую банку, 3, 4 или 5 контурных ячейковых или безъячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

АО «Усолъе-сибирский химфармзавод»

Россия, 665462, Иркутская область, г. Усолъе-Сибирское, северо-западная часть города, с северо-восточной стороны, в 115 м от Прибайкальской автодороги.

тел./факс: (39543) 5-89-10, 5-89-08.

Владелец регистрационного удостоверения/Организация принимающая претензии потребителей

АО «Усолъе-сибирский химфармзавод»

Россия, 665462, Иркутская область, г. Усолъе-Сибирское, северо-западная часть города, с северо-восточной стороны, в 115 м от Прибайкальской автодороги.

тел./факс: (39543) 5-89-10, 5-89-08.