

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Клей БФ-6

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Клей БФ-6

Международное непатентованное или группировочное наименование:

фенолформальдегидная смола

Лекарственная форма: раствор для наружного применения спиртовой

Состав

Действующее вещество

Фенолформальдегидная смола (лак бекелитовый в пересчете на сухое вещество) (марок ЛБС-1, ЛБС-2) 1,65 г

Вспомогательные вещества:

Поливинилбутирамид (поливинилбутираль) марок КА, КБ 9,7 г

Дибутилфталат 3,5 г

Клещевины обыкновенной семян масло (касторовое масло) 1,75 г

Канифоль 0,85 г

Этанол (спирт этиловый) 95 % 82,55 г

Описание

Прозрачная или слегка мутная жидкость светло-желтого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептическое средство.

Код АТХ: D08AE

Фармакологические свойства

Клей БФ-6 оказывает ранозаживляющее, антисептическое действие. Используется как бактерицидное и изолирующее средство, способствует заживлению мелких повреждений кожи вследствие образования на их поверхности изолирующей пленки, стойкой к механическим и химическим воздействиям.

Показания к применению

Препарат применяют для обработки микротравм (ссадин, царапин, порезов и других мелких повреждений кожи), послеоперационных швов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 1 года.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

На основании существующих данных применение препарата Клей БФ-6 в терапевтических дозах при беременности не оказывает отрицательного влияния на развивающийся плод. Перед применением препарата, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом. Перед применением в период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно. Перед нанесением препарата участок кожи тщательно очищают от загрязнения. Ватным или марлевым тампоном останавливают кровотечение и просушивают место, которое необходимо покрыть клеем. Препарат наносят непосредственно на поврежденную поверхность тонким слоем, захватывая окружающие здоровые ткани. В случае нарушения целостности пленки сверху на нее наносят новую пленку. Пленка образуется в течение 2-5 минут после нанесения препарата и прочно удерживается на коже на протяжении 2-3 дней. Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие

Жжение в месте нанесения, аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки препарата не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Препарат не оказывает отрицательного влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения спиртовой

По 5 г, 10 г, 15 г, 20 г, 25 г, 30 г, 40 г во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками полиэтиленовыми и навинчиваемыми крышками ПВД (полиэтилена высокого давления) или укупоренные крышками навинчиваемыми.

Допускается комплектация флаконов оранжевого стекла по 10 г, 15 г, 25 г с крышкой лопаткой из полипропилена.

На флаконы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящиеся.

По 5 г, 10 г, 15 г, 25 г, 30 г, 40 г, в тубы алюминиевые. Каждый флакон или алюминиевую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С вдали от источников нагрева и открытого огня. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии:

АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»

Россия, 665462, Иркутская область, г. Усолъе-Сибирское, северо-западная часть города, с северо-восточной стороны, в 115 м от Прибайкальской автодороги.

тел./факс: +7 (39543) 58910, +7(39543) 58908

Генеральный директор

АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»

Тюстин С.В.