

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО  
ПРЕПАРАТА**

**БЕНЗОСТЕЗОЛ**

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** БЕНЗОСТЕЗОЛ

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Бензокаин + Висмута субгаллат + Цинка оксид + [Левометол]

**Лекарственная форма:** суппозитории ректальные

**Состав на 1 суппозиторий:**

*Действующие вещества*

Бензокаин	100,0 мг
Висмута субгаллат	40,0 мг
Левоментол	4,0 мг
Цинка оксид	20,0 мг

*Вспомогательные вещества*

Макрогол 1500	2314,2 мг
Макрогол 400	121,8 мг
Масса суппозитория	2,60 г

**Описание**

Суппозитории торпедообразной формы желтого или зеленовато-желтого цвета. Допускается наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

**Фармакотерапевтическая группа:** средство лечения геморроя.

**Код АТХ:** C05AD03

**Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат, оказывает местноанестезирующее, антисептическое, вяжущее и подсушивающее действие.

**Показания к применению**

Геморрой, трещины заднего прохода

**Противопоказания**

Гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 12 лет).

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания***Применение при беременности*

Применение препарата Бензостезол при беременности возможно, если потенциальная польза для матери превышает риск для ребенка и плода.

*Применение в период грудного вскармливания*

Применение препарата Бензостезол в период грудного вскармливания возможно, если потенциальная польза для матери превышает риск для ребенка и плода.

В случае необходимости применения препарата в период беременности или в период грудного вскармливания необходимо дополнительно проконсультироваться с врачом.

**Способ применения и дозы**

Ректально.

Взрослые и дети старше 12 лет.

По 1 суппозиторию 1 - 2 раза в сутки, с интервалом между использованием не менее 6 часов. Предварительно освободив суппозиторий от контурной ячейковой упаковки, вводят в задний проход (после очистительной клизмы или самопроизвольного опорожнения кишечника). Курс лечения зависит от тяжести и характера заболевания, как правило, составляет 7-10 дней. При необходимости по рекомендации врача курс лечения может быть продлен до 2 недель. Повторные курсы терапии возможны после консультации врача.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению».

**Побочное действие**

Жжение в заднем проходе, слабительный эффект, аллергические реакции.

Имеются отдельные сообщения о случаях развития метгемоглобинемии при применении препаратов, содержащих бензокаин.

Если у вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

#### *Симптомы*

Симптомы передозировки могут быть связаны с фармакологическими эффектами бензокаина. Системная абсорбция бензокаина при передозировке может проявляться сонливостью, беспокойством, возбуждением, в тяжелых случаях – судорогами. Крайне редко большие дозы бензокаина могут вызвать метгемоглобинемию, которая проявляется цианозом, дыхательными расстройствами, головокружением, слабостью, тахикардией.

#### *Лечение*

Симптоматическое. При метгемоглобинемии показано применение аскорбиновой кислоты – 1 г внутрь или в форме натриевой соли внутривенно – 0,1-0,15 мл/кг 1 % раствора до 50 мл.

При передозировке препарата необходимо немедленно обратиться к врачу.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Лекарственное взаимодействие препарата Бензостезол не описано.

### **Особые указания**

При применении препарата необходимо следить за гигиеной анальной области, избегать чрезмерного напряжения, принимать меры для поддержания мягкой консистенции стула.

Имеются отдельные сообщения о случаях развития метгемоглобинемии при применении препаратов, содержащих бензокаин.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. Не превышайте максимальные сроки лечения и рекомендованные дозы при самостоятельном применении препарата.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами механизмами**

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Форма выпуска**

Суппозитории ректальные 100 мг + 40 мг + 20 мг + 4 мг.

По 5 суппозитория в контурную ячейковую упаковку из пленки ПВХ/ПЭ белой комбинированной или из пленки поливинилхлоридной марки.

На контурную ячейковую упаковку допускается наклеивать этикетку из бумаги писчей, или этикеточной, или самоклеющуюся этикетку.

1 или 2 контурные ячейковые упаковки по 5 суппозитория вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

При температуре не выше 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не применять препарат после истечения срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Производитель/организация, принимающая претензии:**

АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»

Россия, 665462, Иркутская область, г.Усолъе-Сибирское, северо-западная часть города, с северо-восточной стороны, в 115 м от Прибайкальской автодороги.

тел./факс: +7 (39543) 58910, +7 (39543) 58908

Генеральный директор

АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»

С.В. Тюстин

